



## Basic and Applied Research (BAR)



# PRINCIPAIS FATORES QUE RETARDAM O DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE EM ADULTOS

Vasconcelos L. F. M<sup>1</sup>; Inácio A. V. T<sup>1</sup>, Lima B.O<sup>1</sup>, Maia C. S<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Estudante do Curso de Medicina/UFPE, <sup>2</sup>Docente/Pesquisador do Departamento de Histologia e Embriologia/UFPE.

### ABSTRACT

O diagnóstico precoce da tuberculose é imprescindível para o controle da doença, visto que a transmissão do bacilo ocorre por vias aéreas e a rapidez na detecção possibilita interação medicamentosa, o que interrompe a cadeia de transmissão do bacilo e consequentemente diminui os níveis de novos casos. Apesar da simplicidade dos métodos de detecção da tuberculose, fatores relacionados à procura do doente pela unidade de saúde, ao diagnóstico preciso e ao início do tratamento após o diagnóstico fazem com que as intervenções ocorram tardiamente. Identificar os fatores que influenciam o atraso do diagnóstico da tuberculose em adultos. Realizou-se uma revisão bibliográfica da literatura nas bases de dados BIREME e na biblioteca virtual SCIELO, utilizando-se os descritores: “Atraso”; “Diagnóstico”; “Tuberculose”. Como critérios de inclusão foram estabelecidos artigos publicados de 2010 a 2016, nos idiomas português e inglês, que abordam a relação temporal entre o início dos sintomas da tuberculose e o começo do tratamento da doença em adultos. A pesquisa resultou em 161 artigos, dos quais 23 foram separados por apresentarem alguma relação com o tema, porém, apenas sete atendiam os critérios de inclusão. Os fatores relacionados ao tempo de procura do paciente pela unidade de saúde estão relacionados com a falta de conhecimento sobre a gravidade dos sintomas e dificuldade de acesso à unidade de saúde. A elevada procura por hospitais como primeiro local para o atendimento reflete a ineficiência da atenção básica no controle da tuberculose, o que resulta no aumento do número de consultas necessárias para o diagnóstico definitivo da doença. O reconhecimento e suspeita da doença por parte dos profissionais de saúde afeta igualmente o tempo de diagnóstico, pois implica na não solicitação de exames e atraso na detecção de tuberculose. O tempo entre o resultado dos exames e o início do tratamento implica no controle da tuberculose, pois a cadeia de transmissão do bacilo é mantida. O tempo para início do tratamento da tuberculose é elevado. Esse atraso sugere a necessidade da implantação de estratégias de diagnóstico da tuberculose, principalmente em áreas de risco, através de medidas pela atenção básica. O acesso ao atendimento nas unidades de saúde e a instrução da população sobre os sintomas da doença são necessários para a redução do tempo do diagnóstico da tuberculose. Da mesma forma, a capacitação dos profissionais de saúde se faz necessária para possibilitar a suspeita da doença e solicitação dos exames.

### Palavras-chave:

Tuberculose, Adultos, Diagnóstico tardio.

### \*Correspondence to Author:

Maia C. S

Docente/Pesquisador do Departamento de Histologia e Embriologia/UFPE.

### How to cite this article:

Vasconcelos L. F. M; Inácio A. V. T, Lima B.O, Maia C. S .PRINCIPAIS FATORES QUE RETARDAM O DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE EM ADULTOS. Basic and Applied Research. 2019, 1:4.



AePub LLC, Houston, TX USA.

Website: <https://aepub.com/>